

# 이비나 액

(디클로페낙)

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

일반의약품

[원료약품 및 그 분량] 이 약(100mL) 중

- **유효성분:** 디클로페낙(별규) 0.074g
- **첨가제(보존제):** 벤잘코늄염화물 0.02g
- **첨가제(타르색소):** 적색40호
- **기타 첨가제:** 레몬엣센스(#75-BD), 박하유, 에데트산나트륨수화물, 에탄올, 정제수, 카르복시 메틸셀룰로오스나트륨, 트롤이민, 폴리옥실40경화피마자유, D-소르비톨액

[성상] 레몬과 민트향이 나는 맑거나 약간 유백광의 빨간 주황색 액제

[효능 · 효과]

다음 질환에 의한 염증의 완화: · 치은염(잇몸염), 구내염(입안염), 인두염 등의 구강인두의 염증  
· 치과 보존치료 또는 발지 후

[용법 · 용량]

1회 15mL 1일 2~3회 원액 그대로 또는 소량의 물로 희석하여 입안을 행구어 내거나 가글한 후,  
뱉는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 아스피린 또는 다른 비스테로이드성 소염진통제에 알레르기 반응(천식, 두드러기 또는 비염)  
및 그 병력이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 2) 소아

3. 다음과 같은 경우 이 약을 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 1주일 정도 사용하고도 증상의 개선이 보이지 않을 경우, 사용을 중지하고 의사, 치과의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 구강점막의 자극 또는 그침이 유발되는 경우
- 3) 장기적으로 사용하면 감작반응이 유발될 수 있다. 이 제품으로 치료를 하는 동안 감작반응이 발생한다면 사용을 중지하며 필요하다면 적절한 처치를 하도록 한다.

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의한다.
- 2) 다른 소염진통제와의 병용은 피하는 것이 바람직하다.
- 3) 이 약은 벤조산나트륨을 포함하고 있으며, 벤조산은 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생  
이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위] 15mLx10

[제조의뢰자] 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

[제조자] (주)제뉴원사이언스 세종특별자치시 전의면 산단길 245

[소비자 상담전화] 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

[기타주의]

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용 시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
  2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거하여 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 「<https://nedrug.mfds.go.kr>」 → 의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)