

목 아플 때 효과 빠름!

미놀 에프 트로키 복숭아맛

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

미놀에프트로키 복숭아맛

일반 의약품

【제품명】 미놀에프트로키(복숭아맛)

【원료약품 및 그 분량】 1트로키 중

- 유효성분 : dl-메틸에페드린염산염(KP) 12.5mg
노스카핀(KP) 10mg
구아아닐살폰산칼륨(LSP) 45mg
세틸피리디늄염화물수화물(EP) 1mg
- 첨가제(타르색소): 적색40호알루미늄레이크, 황색5호알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소의 우유)
- 기타 첨가제: 분당, 스테아르산디스테아레이트, 아세살팜칼륨, 아스파탐, 조합항료복숭아향분말 22124000, 조합항료페퍼민트향분말 22044079, 포비돈, D-나트륨, 1-멘톨

【성상】 분홍색 내지 연분홍색의 구멍이 뚫린 원형 트로키제

【효능·효과】 기침, 가래, 천식, 구내염(입안염), 편도염, 인·후두(목구멍)염으로 인한 목심·목의 불편감·인후(목구멍)통·목이 부어오름

【용법·용량】 다음 복용량을 씹거나 삼키지 말고, 입안에서 천천히 녹여서 복용한다.

- 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1정씩 1일 6회(복용간격 2시간 이상)
- 만 11세 이상~만 15세 미만 : 1회 1정씩 1일 4회(복용간격 3시간 이상)
- 만 8세 이상~만 11세 미만 : 1회 1정씩 1일 3회(복용간격 4시간 이상)

【사용상의 주의사항】

1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에 투여하지 말 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 4) MAC약제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 진해기침을 그치게 돕는 약(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)염증 경구제, 멀미약, 알레르기용약, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 수유부
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속되는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 7) 편도선절제술, 구강입안수술 후 7일 이내의 사람
- 8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 경우, 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
- 3) 만 7세 이하의 영(갓난아기)·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 12트로키

【제 조 자】 경남제약(주)

충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길49



※ 기타 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. PTP포장을 개봉하여 복용 시 가끔 트로키제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으나 복용 시 트로키제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.
3. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하십시오.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 기타 자세한 약품 정보는 약품통합정보시스템 'http://nedrug.mfds.go.kr' → '약품동등 검색' 을 참조하시기 바랍니다.

※ 약약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

경남제약(주)

PP2203-N01
첨부문서 작성연월일 2023. 03. 06

목 아플 때 효과 빠름!

미놀

에프 트로키
페퍼민트맛
MYNOL

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

미놀에프트로키 페퍼민트맛

일반 의약품
분류번호 : 222

【제품명】 미놀에프트로키(페퍼민트맛)

【원료약품 및 그 분량】 1트로키 중

- 유효성분 : dl-메틸에페드린염산염(KP).....12.5mg
노스카핀(KP).....10mg
구아아닐 살폰산칼륨(USP).....45mg
세틸피리디늄염화물수화물(FP).....1mg
- 첨가제(타르색소): 적색40호알루미늄레이크, 황색5호알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소의 우유)
- 기타 첨가제: 레몬향, 분당, 스테아르산, 스테아르산마그네슘, 시트르산, 아스파탐, 페퍼민트, 히드록시프로필셀룰로오스, D-만니톨, 1-멘톨

【성상】 분홍색의 구멍이 뚫린 원형 트로키제

【효능·효과】 기침, 가래, 천식, 구내염(입안염), 편도염, 인·후두(목구멍)염으로 인한 목심·목의 불쾌감·인후(목구멍)통·목이 부어오름

【용법·용량】 다음 복용량을 씹거나 삼키지 말고, 입안에서 천천히 녹여서 복용한다.

- 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1정씩 1일 6회(복용간격 2시간 이상)
- 만 11세 이상~만 15세 미만 : 1회 1정씩 1일 4회(복용간격 3시간 이상)
- 만 8세 이상~만 11세 미만 : 1회 1정씩 1일 3회(복용간격 4시간 이상)

【사용상의 주의사항】

- 1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 진해기침을 그치게 돕는(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)교염용 경구제, 말미약, 알레르기약, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 일레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 긴장질환, 심장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 수유부
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속되는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 7) 편도선절제술, 구강입안수술 후 7일 이내의 사람
- 8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 경우, 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적충혈되어 붉어짐, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
- 3) 만 7세 이하의 영(갓)난아기·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 12트로키, 24트로키

【제 조 자】 경남제약주

충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49



※ 기타 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. PTP포장을 개봉하여 복용 시 가뭇 트로키제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 트로키제에 포장물이 있는지 꼭 확인하고 복용하십시오.
3. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 기타 자세한 약품 정보는 우편통합정보시스템 「http://nedrug.mfds.go.kr」 → 「약품 등 검색」 을 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

경남제약주

PP0486-M05
첨부문서 작성연월일 2022. 10. 11

